A 226
244



Дозволено цензурою. — Ревель, 23 Февраля 1884 г.

Печатня Г. Матизена, Ревель, Никольская 23.

Г.М.П.М.

НАСТАВЛЕНІЕ

для опредѣленія годности лошадей и раздѣленія ихъ по сортамъ, при поставкѣ въ войска, въ случаѣ войны.

Отдѣлъ I-й.

Правила опредѣленія годности лошадей.

§ 1.

Лошадь, предназначающаяся для службы въ войскахъ, можетъ быть всякаго пола и масти, главное, чтобы она была годна для немедленнаго употребленія въ усиленную работу, при томъ, не моложе 4-хъ лѣтъ и не ниже 1 арш. 14 вершк. росту.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ Военное Министерство признаетъ возможнымъ, допускаются къ пріему лошади и ниже 1 арш. 14 вершк., въ особенности при поставкѣ ихъ въ транспорты, формируемые изъ мѣстныхъ повозокъ.

§ 2.

Признаются негодными лошади:

а) слабосильныя, (безразлично отъ того ли, что дурно сложены, или вслѣдствіе изнуренія работою или безкормицею);

б) имѣющія на копытахъ трещины, идущія отъ вѣнчика;

в) съ выпуклыми и плоскими копытами;

г) съ гнилою стрѣлкою;

д) имѣющія дрожаніе въ переднихъ колѣнахъ, въ особенности сопряженное со сгибомъ ихъ впередъ;

е) со сгибомъ переднихъ колѣнъ впередъ, (козинецъ) для верховаго сорта;

ж) съ запавшею грудью;

з) съ нецѣлымъ языкомъ;

и) вислоухія, при полной неспособности двигать ушами и вислогубыя (параличь);

к) съ подведеннымъ животомъ и всякаго рода грыжею;

л) со сквозными наливами въ скакательныхъ составахъ (для верховаго и артиллерійскаго сортовъ);

м) со сбитымъ маклакомъ, если при этомъ лошадь тянетъ ногу соотвѣтствующей стороны;

н) съ костяными наростами на ногахъ близь сухихъ жилъ, что производитъ хромоту;

о) съ роговымъ наростомъ подъ щеткой (отъ мокреца);

п) оказывающія при движеніи одышку, свистъ, хрипоту или ревъ;

р) забивающія на ходу ноги одна о другую;

с) сильно спотыкающіяся, вслѣдствіе чего иногда бываетъ опухоль на переднихъ колѣнахъ;

т) съ постояннымъ сильнымъ вздергиваніемъ въ заднихъ ногахъ при движеніи (шпатъ);

у) оказавшіяся при внимательномъ осмотрѣ неукротимыми или злонравными;

ф) явно жеребыя и матки съ сосунами, и

х) вообще явно больныя, когда болѣзнь препятствуетъ къ употребленію въ работу; въ особенности: съ запаломъ, мытомъ, сапомъ, лихимъ, (чильчакъ) оглумомъ (тихій коллеръ), чесоткою, разнаго вида слѣпотой и разнаго рода хромотой.

Отдѣлъ II-й.

Правила распредѣленія годныхъ лошадей по сортамъ.

Лошади, годныя на службу въ войскахъ, подраздѣляются на 4 сорта:

1) *Верховый сортъ.* Лошадь должна быть легка и поворотлива; при высокомъ поставѣ шеи имѣть: спину прямую и короткую (около $^1/_3$ длины всего туловища), поясницу короткую и широкую: крестецъ прямой и длинный; росту не менѣе 2-хъ арш. 1 вершка, въ возрастѣ отъ 4-хъ до 9-ти лѣтъ (если выѣзжена подъ верхъ, то до 15 лѣтъ), всѣхъ половъ и мастей.

2) *Артиллерійскій сортъ.* Упряжная лошадь всякой масти (кромѣ свѣтло-сѣрой и бѣлой), не ниже 2-хъ аршинъ, не моложе 5 лѣтъ, широкаго и плотнаго склада, при способности къ быстрымъ движеніямъ.

3) *Обозный 1-го разряда сортъ.* Упряжная лошадь, не ниже 2-хъ аршинъ, всѣхъ мастей, не

моложе 5 лѣтъ, широкаго и плотнаго склада; допускаются слѣпыя на одинъ глазъ.

4) *Обозныя 2-го разряда.* Упряжная лошадь, росту не ниже 1 арш. 14 вершк., не моложе 5 лѣтъ, широкаго и плотнаго склада; допускаются слѣпыя на одинъ глазъ.

Приложенія: 1) Порядокъ осмотра лошадей на сборномъ и сдаточномъ пунктахъ, для выбора годныхъ и сортировка ихъ.

2) Описаніе болѣзней, которыя дѣлаютъ лошадь безусловно негодною для службы въ войскахъ.

Приложеніе I.

Порядокъ осмотра лошадей на сборномъ и сдаточномъ пунктахъ, для выбора годныхъ и сортировки ихъ.

§ 1.

Лошади осматриваются каждая отдѣльно.

§ 2.

Осмотръ лошади производится на ровномъ, твердаго грунта, мѣстѣ.

§ 3.

Лошадь должно поставить правильно, т. е., ровно на всѣхъ ногахъ.

§ 4.

Самый осмотръ лошади производить въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:

А) Опредѣленіе лѣтъ*) (не моложе 4-хъ — для верховаго сорта, и 5 лѣтъ — для артиллерійскаго и обозныхъ сортовъ).

Б) Измѣреніе роста, по которому годныя лошади сортируются на три разряда;

1) Верховыхъ (не ниже 2 арш. 1 верш.), 2) артиллерійскихъ, 3) обозныхъ 1-го разряда (не ниже 2 арш.), 2-го разряда (не ниже 1-го арш. 14 вершк. и съ допускомъ въ опредѣленныхъ инструкціею случаяхъ, лошадей и ниже этого роста).

В) Осмотръ на мѣстѣ переда лошади: а) переднія копыта: (на стѣнкахъ трещины, въ подошвѣ выпуклость, и въ стрѣлкѣ гнилость; б) переднія ноги (костяные наросты, козинецъ — для верховаго сорта, дрожаніе колѣнъ); в) грудь (запавшая); г) губы (вислогубость); д) языкъ (нецѣлость его); е) осмотръ подъ челюстями (желваки, какъ одинъ изъ признаковъ мыта, или сапа); ж) глаза (слѣпота); з) уши (вислоухость при неподвижности); и) поставъ шеи для опредѣленія сорта лошади: верховая или упряжная.

Г) Осмотръ на мѣстѣ съ боку: а) спина (провалившаяся), длина ея, въ видахъ опредѣленія

---

*) Въ скобкахъ обозначены пороки, по которымъ лошадь подлежитъ браку, а также признаки, на основаніи которыхъ лошади распредѣляются по сортамъ.

сорта лошади: верховая или упряжная; б) животъ (запалъ, грыжа).

Д) Осмотръ на мѣстѣ зада: а) крестецъ (сбитый маклакъ); б) заднія ноги (костяные наросты и мокрецы).

Е) Осмотръ при движеніи: а) осаживаніе и затѣмъ — быстрое движеніе впередъ (вздергиваніе заднихъ ногъ, шпатъ); б) проводка шагомъ, при чемъ слѣдуетъ обратить вниманіе на свободу движеній, правильное наступаніе ногами, вздергиваніе заднихъ ногъ, и высокій выносъ переднихъ ногъ, (послѣднее обозначаетъ совершенную слѣпоту) и в) проводка рысью, при чемъ обращается вниманіе на свободу дыханія, втягиваніе живота (запалъ) и не забиваетъ ли ногами.

Приложеніе II.

Описаніе болѣзней, которыя дѣлаютъ лошадь безусловно негодною для службы въ войскахъ.

Запаломъ (одышкою, удушьемъ), называется ускоренное и тяжелое дыханіе, замѣчаемое не только во время движенія, но иногда даже при покойномъ состояніи. При этомъ бываютъ впалые пахи и подведенный животъ и лошадь сильно и неравномѣрно водитъ боками, такъ, что вдоль нижнихъ окончаній реберъ, замѣчается, какъ бы желобокъ, рѣзко обозначающійся при выдыхиваніи. Запалъ неизлѣчимъ.

Мытъ состоитъ въ усиленномъ истеченіи изъ

носа густой, грязнаго оттѣнка, гноевидной слизи, съ образованіемъ подъ челюстью большой мягкой опухоли, въ которой образуется нарывъ, чрезъ нѣсколько дней прорывающійся.

Когда гной вытечетъ, опухоль уменьшается и наконецъ совершенно исчезаетъ. Вообще, дней чрезъ 10—15, истеченіе изъ носа также прекращается, и тогда лошадь выздоравливаетъ.

Но, иногда также истеченіе затягивается на нѣсколько недѣль и мѣсяцевъ, и даже совершенно не излѣчивается. Этотъ видъ мыта называется *хроническимъ* или *застарѣлымъ* или *затяжнымъ*. Въ послѣднемъ случаѣ, истеченіе изъ носа, то усиливается, то уменьшается и даже на время совершенно прекращается. Въ носу оболочка дѣлается то красною, то весьма блѣдною и иногда съ маленькими язвами краснаго цвѣта. При застарѣломъ мытѣ, всегда бываетъ опухоль подъ челюстью; но опухоль эта твердая, величиною въ грецкій орѣхъ и какъ бы приросшая къ кости.

Чаще всего застарѣлый мытъ остается на всегда и въ такомъ случаѣ, иногда къ нему присоединяется сапъ.

Сапъ представляется въ формѣ бугорковъ легко осязаемыхъ пальцемъ или язвинокъ на оболочкѣ носа, которыя имѣютъ, какъ бы приподнятые края, и бѣловатую, похожую на сало, средину. При этомъ бываетъ истеченіе изъ носа клочковатое, засыхающее въ кору на верхней губѣ и опухоли

подъ челюстью, такія же, какъ и при застарѣломъ мытѣ.

Болѣзнь неизлѣчима и заразительна не только для лошади, но особенно для человѣка, для котораго она безусловно смертельна.

Лихой (чильчакъ), состоитъ въ образованіи на кожѣ точно такихъ же язвинокъ, какъ при сапѣ на оболочкѣ носа. Иногда лихой бываетъ только на кожѣ, въ видѣ узловъ, по направленію пасочныхъ сосудовъ (въ видѣ четомъ), но чаще всего къ нему присоединяются такія же язвы и въ носу, такое же истеченіе и опухоль подъ челюстью, какъ и при сапѣ. Лихой неизлѣчимъ и также заразителенъ для лошадей и человѣка.

Оглумъ (коллеръ), обнаруживается припадками, какъ бы соннаго, оглушеннаго состоянія. Вообще лошадь теряетъ сознаніе, дѣлается нечувствительною къ уколамъ, къ щекотанію въ ушахъ и къ нажатію ногою на вѣнчикъ копыта, упирается головою въ ясли, или безъ удержу пятится назадъ; когда она на свободѣ, то вертится въ ту или другую сторону; иногда же приходитъ въ неистовство, бросается въ конюшнѣ, на стѣну, несется на свободѣ куда попало, а не то усиленно бросается на землю. Хотя отдѣльные припадки и проходятъ, но потомъ возвращается и вообще болѣзнь неизлечима.

Чесотка (короста или парши), обнаруживается на тѣлѣ лошади, сначала въ видѣ мелкихъ прыщиковъ, потомъ — струпьевъ или коры и сопро-

вождается сильнымъ зудомъ, который заставляетъ лошадь безпрестанно тереться о стѣны, чесаться. Болѣзнь эта излѣчивается, но долго длится и заразительна для лошадей.

Мокрецъ (подсѣдъ), обнаруживается ранками на задней части бабки, подъ щеткою. Сначала на этомъ мѣстѣ кожа покрывается сыпью, а потомъ, по мѣрѣ того, какъ начнутъ лопаться прыщики, выпадаетъ шерсть и образуются ранки, такъ называемыя трещины въ кожѣ.

При правильномъ пособіи, ранки скоро заживаютъ, безъ всякихъ слѣдовъ. Если же леченіе было небрежное или неправильное, чаще всего при присыпкахъ обнаженныхъ отъ кожи мѣстъ, квасцами и купоросомъ, ранки едва успѣютъ зажить, какъ при малѣйшемъ движеніи кожа снова трескается и мокрецъ затягивается на долго. Въ этихъ случаяхъ, нерѣдко, на мѣстѣ зажившихъ трещинъ, образуются роговые наросты, которые иногда достигаютъ такихъ большихъ размѣровъ, что мѣшаютъ движенію и лошадь хромаетъ. Наросты эти неизлѣчимы.

Слѣпота на одинъ или на оба глаза, можетъ происходить: а) отъ образованія бѣлой мутности въ прозрачныхъ частяхъ глаза; б) отъ періодическаго воспаленія глаза; в) отъ темной воды. Слѣпая на оба глаза лошадь, стоя на мѣстѣ, безпрестанно водитъ ушами и прислушивается къ малѣйшему шуму; при движеніи же несетъ ноги

высоко, какъ бы переходя въ бродъ и не различаетъ препятствій.

При подозрѣніи въ слѣпотѣ на одинъ глазъ, нужно завязать здоровый глазъ, и тогда лошадь при движеніи обнаружитъ тѣ же явленія.

а) При осмотрѣ глаза, если прозрачная передняя часть его окажется бѣло-мутною, и при этомъ будетъ опухоль, жаръ и краснота вѣкъ, то при правильномъ леченіи можно надѣяться на прояснѣніе. Если же такая мутность будетъ давная, т. е. безъ опухоли, жара и краснотыя вѣкъ, то она остается на всегда и, смотря по степени мутности, или лошадь будетъ слабо различать предметы, или же, при густой мутности, совершенно не будетъ видѣть. Иногда такая мутность остается только въ видѣ небольшаго бѣлаго пятнышка, такъ называемаго глазная коршка, тогда нужно обратить вниманіе на мѣсто ея нахожденія: если она будетъ противъ зрачка, то, смотря по величинѣ коршки и степени мутности ея, лошадь или плохо, или совсѣмъ не будетъ видѣть; въ противномъ случаѣ коршка не мѣшаетъ зрѣнію.

Этотъ видъ слѣпоты различается легко: смотря на глазъ спереди и съ боку всегда можно замѣтить, что мутность сосредоточивается въ передней прозрачной его части. Болѣе трудно различать ту слѣпоту, которая зависитъ отъ помутнѣнія внутренней прозрачной части глаза, особенно если пораженъ только одинъ глазъ. Внутри глаза, за

зрачкомъ, лежитъ прозрачное тѣло, называемое хрусталикомъ.

Мутность внутри глаза именно и сосредоточивается въ хрусталикѣ, въ видѣ густой бѣловатой массы, напоминающей собою перломутровую поверхность. Это, такъ называемое бѣльмо (катаракта). У лошади бѣльмо неизлечимо, и такимъ глазомъ она ничего не видитъ. Присутствіе бѣльма въ точности можно опредѣлить только въ такомъ случаѣ, если смотрѣть въ глазъ прямо; сбоку же не замѣтно этой мутности.

б) Такъ же трудно узнается такъ называемая *лунная слѣпота*, т. е. болѣзненное состояніе внутреннихъ частей глаза, способное возвращаться чрезъ 3 –5 недѣль, но иногда чрезъ 6 9 мѣсяцевъ. Болѣзнь сосредоточивается, главнымъ образомъ, въ той внутренней части глаза, въ которой находится овальное отверстіе, называемое зрачкомъ и самый характерный признакъ ея, гнойный выпотъ въ камерѣ глаза и *постоянное сужденіе зрачка*, которое съ возвратами болѣзни усиливается все болѣе и болѣе, и доходитъ даже до совершеннаго зарощенія его.

Болѣзнь встрѣчается весьма рѣдко и отдѣльныя проявленія ея уступаютъ леченію, но вообще она неизлечима и всегда влечетъ за собою слѣпоту – вслѣдствіе зарощенія зрачка, а иногда и вслѣдствіе образованія бѣльма.

в) Труднѣе всего открывается слѣпота при такъ

называемой *темной водь*, особенно когда поражается только одинъ глазъ. Болѣзнь состоитъ въ онѣмѣніи (параличѣ) той внутренней части глаза, которая принимаетъ свѣтъ и отъ которой зависитъ собственно зрѣніе (окончаніе зрительнаго нерва). Такъ какъ здѣсь подвергается болѣзни лишь зрительный нервъ, а остальныя части глаза здоровы, то при осмотрѣ, глазъ, представляется совершенно чистымъ, но нѣтъ уже во взглядѣ довѣрчивости, и зрачекъ оказывается *постоянно расширеннымъ*, нисколько не съуживаясь при дѣйствіи на глазъ, даже самаго сильнаго свѣта, тогда какъ въ здоровомъ глазу, уже при нѣкоторой темнотѣ онъ расширается, а при увеличеніи свѣта, замѣтно съуживается.

Болѣзнь неизлечима.

Сквозными наливами называется мягкая опухоль въ скакательномъ составѣ въ задней части его и вверху (между голенью и пяткою). При давленіи рукой съ одной стороны, опухоль сильнѣе выпячивается въ противоположную сторону.

Плоскимъ копытомъ называется то копыто, стѣнки котораго весьма отлоги и подошва нисколько не выгнута, а совершенно плоская и даже можетъ быть иногда выпуклая.

Копыто съ выпуклою подошвою называется пуповиннымъ.

При плоской и пуповинной формахъ копытъ,

очень легко образуются наминки, не только отъ давленія на подошву подковою, но и вслѣдствіе движеній, по неровнымъ дорогамъ.

Хромотою называется неправильное движеніе лошади, при чемъ она не можетъ свободно наступать больною ногою. Хромота можетъ происходить отъ весьма различныхъ причинъ и чаще всего отъ ушибовъ, растяженій и раненій, особенно въ составахъ. Болѣе опасная хромота бываетъ отъ поврежденій въ плечевомъ и бедренномъ составахъ, а также и хромота отъ поврежденій различныхъ частей копыт.

Плечевая хромота (сплекъ) и бедренная хромота, узнаются при движеніи, при чемъ лошадь больную ногу волочитъ и вынося впередъ описываетъ дугу въ наружную сторону; стоя же на мѣстѣ при плечевой хромотѣ — отставляетъ ногу впередъ, а при бедренной хромотѣ всю тяжесть зада передаетъ на здоровую ногу, вслѣдствіе чего крестецъ кажется опущеннымъ въ ту сторону.

Хромота отъ поврежденій внутреннихъ частей копыта узнается по тому, что лошадь при движеніи не наступаетъ вѣрно подошвою копыта, но только переднею частью его, (зацѣпомъ).

Если болѣзнь недавняя, то копыто будетъ горячее и можетъ пройти, но если копыто уже холодное, то трудно ожидать совершеннаго выздоровленія.

Хромота можетъ быть и отъ продольныхъ трещинъ въ копытѣ, при чемъ слѣдуетъ обращать особенное

вниманіе на тѣ трещины, которыя идутъ сверху внизъ, (отъ вѣнчика).

Если хромота завизитъ отъ прѣлости роговой стрѣлки копыта, то, при сухомъ и чистомъ содержаніи, прѣлость прекращается и лошадь перестаетъ хромать. Если хромота зависитъ отъ дурной ковки, то правильная перековка даетъ возможность лошади итди свободно, а слѣдовательно, и не будетъ хромоты, кромѣ того хромота можетъ быть отъ высшей степени прѣлости, такъ называемаго гніенія стрѣлки. При гніеніи стрѣлки, копыто съуживается, а иногда развивается и ракъ; то и другое неизлечимо.

2007097077